

Procedure
TILT TEST

Proceseigenaar	Code	Versie	Versiedatum	Geldig tot	Pagina's
Xavier Van Vlasselaer	PROC-VPK-INW-CARDIO-Tilt test-03	03	01/05/2014	01/05/2017	1

Trefwoorden

Tilt test; Opname; Stappenplan.

Doelstelling

Een verpleegkundig stappenplan bij opname van een patiënt voor een Tilt test.

Proces: TILT TEST

Definitie

Een tilt test wordt uitgevoerd bij mensen met recidiverende syncopes. De tilt test is een onderzoek om na te gaan of vasodepressie aan de oorzaak ligt van de syncopes.

Vorbereiding

- Afspraak op RX voor tafel met inclinatiemogelijkheid
- Patiënt nuchter houden (indien test om 17u = nuchter na middagmaal)
- Infuus prikken op artsenvoorschrift (1l. NaCl. 0.9%) in linker arm
- Pat. informeren en geruststellen
- Pat. transport naar RX met bed
- Zo gevraagd pat. dossier meegeven

Onderzoek

- Pat. 5' laten plat liggen
- Arts verwittigen bij start
- Aanleggen EKG
- Aanleggen automatische BD-meter
- Geen conversatie met patiënt (rustige situatie)
- Om de 5' een ritmestroom van 10 cm laten lopen (met polsfrequentie)
- BD noteren
- Indien syncope optreedt, EKG laten lopen, tafel platleggen en meten van BD.

- Soms wordt de test uitgevoerd onder medicatie (vb. beta-blocker)
- Verkorte test: infuus met isuprel (10%; eerst 1 µg/min, vervolgens eventueel 5 µg/min)

Nazorg

- Protocol in dossier (op dokterskar)
- Pat. terug installeren op de kamer
- Parameters opvolgen volgens vaste afspraak

Goedkeuring door	Functie	Datum	Handtekening